

*Досягнення
і проблеми
клінічної
інфектології*

Матеріали
науково-
практичної
конференції
і пленуму
Асоціації
інфекціоністів
України

*21-22 травня
2008 року,
м. Тернопіль*

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ. ВІЛ/СНІД

І.А. Анастасій

ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ СЕРЕД ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
м. Київ

СНІД залишається глобальною проблемою людства. За даними Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу, на кінець 2006 р. у світі було інфіковано ВІЛом біля 40 млн осіб, з них 17,7 млн – жінки. Кількість померлих від СНІДу у 2006 р. становила 2,9 млн. На сьогоднішній день Україна є епіцентром епідемії ВІЛ/СНІДу у Східній Європі. Нині можна констатувати “фемінізацію” епідемії ВІЛ-інфекції у світі. Про суттєву частку серед ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку свідчить таке: за зростанням кількості дітей, які народжені ВІЛ-позитивними ма-терями, Україна вважається однією з найгірших країн у Європі.

Мета дослідження – вивчити особливості епідемії ВІЛ/СНІДу серед жінок віком від 15 до 49 років. Задачі дослідження – ретроспективний аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію жінок репродуктивного віку в Україні за 1999-2006 рр.; оцінка кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками. Використовували дані оперативної інформації “Про офіційно зареєстрованих хворих на ВІЛ/СНІД”.

У третьому періоді розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу (1999-2006 рр.) відзначається неухильне збільшення кількості жінок ре-продуктивного віку, інфікованих ВІЛом. Так, у 1999 р. їх кількість складала 1781 особа; у 2000 р. – 1873; у 2001 р. – 2218; у 2002 р. – 2804; у 2003 р. – 3406; у 2004 р. – 4058; у 2005 р. – 4428 і у 2006 р. – 5240 осіб, тобто показник захворюваності збільшився з 13,85

до 42,40 на 100 тис. жіночого населення, приріст +206,14 %. Істотно збільшилася частка жінок серед офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих віком від 15 до 49 років, а саме з 25,1 до 40,8 %. Постійно продовжує зростати кількість вагітних серед ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку – з 21,3 % в 1999 р. до 42,0 % у 2006 р. Це, у свою чергу, призводить до збільшення кількості дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, – в 1999 р. вони склали 2,2 % від загальної кількості нових випадків ВІЛ-інфекції, а у 2006 р. – 17,2 % (2822 дитини). На 01.01.2007 р. під диспансерним наглядом перебувають 5978 дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками, з них – 1367 дітей зі встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції та 4611 дітей віком до 18 міс., в яких діагноз знаходиться у стадії уточнення. Більшість ВІЛ-позитивних дітей в Україні отримали ВІЛ від матері шляхом вертикальної трансмісії, яка може реалізуватись кількома шляхами, а саме: під час вагітності; під час пологів; через грудне вигодовування.

Для подолання ситуації з ВІЛ/СНІДу серед осіб репродуктивного віку в Україні необхідним є проведення суворого Національного моніторингу – забезпечення і проведення тестування на ВІЛ усіх вагітних, активне проведення просвітницької діяльності серед населення, особливо серед молоді.

Н.Г. Бичкова, О.В. Вінницька

ГОСТРИЙ ГЕПАТИТ В У ПОЄДНАННІ З НЕМАТОДОЗАМИ – ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
м. Київ

За даними ВООЗ, у світі понад 500 млн людей хворіють на гепатит В (ГВ). Численні фактори впливають на формування наслідків захворювання, тому гостра патологія печінки не завжди закінчується одужанням, захворювання може набувати хроніч-