

ISSN 1811-2

ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНІ



2(21)/2014

науково-практичний журнал

ЗМІСТ

ПАМ'ЯТІ РЕКТОРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАНУ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ І ТЕХНІКИ, ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА ЯКИМОВИЧА КОВАЛЬЧУКА.....	11
H. С. Михайлівська, Т. О. Кулинич, О. В. Кулинич ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОЇ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ НА РОЗВИТОК КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕнь У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych, O. V. Kulynych INFLUENCE OF ENDURED COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA TO DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE	12
K. А. Посохова, І. П. Стечишин, В. В. Підгірний ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНОВІМІСНИХ СПОЛУК НА СТАН МІОКАРДА ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ K. A. Posokhova, I. P. Stechyshyn, V. V. Pidhirnyy INFLUENCE OF CORVITIN-CONTAINING COMPOUNDS ON MYOCARDIUM STATUS IN DIABETES MELLITES TYPE 2	17
O. В. Тригубчак МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК O. V. Tryhubchak MARKETING RESEARCHES OF EFFERVESCENT TABLETS MARKET	22
O. В. Авдеєв ДИНАМІКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДINI ДІТЕЙ ПРИ ЛІКУВАННІ ГІНГІВІТУ O. V. Avdyeyev DYNAMICS OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID OF CHILDREN IN THE TREATMENT OF GINGIVITIS	26
L. А. Бойко, Л. С. Фіра, П. Г. Лихатський АКТИВНІСТЬ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ОРГАНАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ УРАЖЕННЯ ЇХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ ТА КАРБОФОСОМ L. A. Boyko, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi ACTIVITY OF THE BIO-ENERGETIC PROCESSES IN THE RAT'S ORGANS AFTER AFFECTING WITH TETRACHLOROMETHANE AND CARBOPHOS	29
O. Р. Боярчук СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОЇ РЕВМАТИЧНОЇ ЛИХОМАНКИ У ДІТЕЙ O. R. Boyarchuk SEASONAL PECULIARITIES OF ACUTE RHEUMATIC FEVER IN CHILDREN	32
D. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко АЛГОРІТМ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МАСАЖУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko ALGORITHM PURPOSE AND PROCEDURE OF MASSAGE FOR USE IN THE INFORMATION SYSTEM OF PHYSICAL REHABILITATION	36
O. В. Вельчинська ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ САРКОМІ 45 ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИМ АДДУКТОМ 1,1-БІС-[5- БРОМОПІРІМІДИН-2',4'-ДІОН-1'-ІЛ]-2-БРОМО-2'-ХЛОРОЕТИЛЕНУ ТА БАКТЕРІЙНОГО ЛЕКТИНУ O. V. Velchynska INVESTIGATION OF THE TREATMENT'S POSSIBILITY OF SARCOMA 45 BY THE CHEMICAL-BIOLOGICAL ADDUCT OF THE BIS-[5-BROMOPYRIMIDINE-2',4'-DIONO-1'-IL]-2-BROMO-2'-CHLOROETHYLENE AND BACTERIAL LECTIN	43
O. С. Волошин, І. Б. Чень, В. Д. Волошин ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ В ОСІБ З РІЗНИМ ІНДЕКСОМ РУФ'Є O. S. Voloshyn, I. B. Chen, V. D. Voloshyn FEATURES OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STATE IN INDIVIDUALS WITH VARIOUS RUFYE'S INDEX.....	45
I. І. Герасимець ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСТОЙКИ ТА ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ ШОВКОВИЦІ ЧОРНОЇ НА МОДЕЛІ ПАРАЦЕТАМОЛОВОГО ГЕПАТИТУ I. I. Herasymets RESEARCH OF THE BLACK MULBERRY LEAVES HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES ON THE MODEL OF PARACETAMOL HEPATITIS	49
I. В. Гунас, О. І. Макарова, А. О. Очертніюк, С. В. Прокопенко ЗМІНИ ВІДНОСНОГО ОБ'ЄМУ ПОШКОДЖЕНИХ ДІЛЯНОК ЛЕГЕНЬ У ЩУРІВ ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ ЛОКАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ШКІРИ ТА ПРИ КОРЕКЦІЇ КОЛОЇДНИМИ ГІПЕРОСМОЛЯРНИМИ РОЗЧИНAMI I. V. Hunas, O. I. Makarova, A. O. Ocheretnyuk, S. V. Prokopenko CHANGE OF RELATIVE VOLUME IN DAMAGED AREAS OF LUNG IN RATS WITHIN ONE MONTH AFTER LOCAL HYPERTHERMIA OF SKIN AND WITH CORRECTION OF COLLOID HYPEROSMOLAR SOLUTION	54
A. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОСТЕКСТРАКЦІЙНОГО АЛЬВЕОЛІТУ У ЩУРІВ A. Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko PATHOGENETIC BASIS POSTEXTRACTION ALVEOLITIS MODELING IN RATS	59

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему
УДК 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ САРКОМІ 45 ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИМ АДДУКТОМ 1,1-БІС-[5-БРОМОПІРИМІДИН-2',4'-ДІОН-1'-ІЛ]-2-БРОМО-2'-ХЛОРОЕТИЛЕНУ ТА БАКТЕРІЙНОГО ЛЕКТИНУ

© О. В. Вельчинська

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

РЕЗЮМЕ. Дослідження антиметаболітів піримідинового обміну, які виступають в якості преформованих сполук в низці біосинтетичних процесів та гальмують пухлинний ріст, є найуспішнішим напрямком пошуку нових протипухлинних засобів. З метою отримання нових потенційних протипухлинних засобів створено оригінальний хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-брому-2'-хлороетилену та протипухлинного бактерійного лектину *Bacillus polytuxa*. Встановлено, що хіміко-біологічний аддукт біс-похідного піримідину та бактерійного лектину, є малотоксичним (LD_{50} : 635 мг/кг) та проявляє значущий протипухлинний ефект на Саркомі 45 з % гальмування пухлинного росту 82,0. Це свідчить про те, що новий хіміко-біологічний аддукт є перспективним для подальшого вивчення як малотоксичної речовини з високою протипухлинною активністю на Саркомі 45.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: піримідин, 5-бromoурацил, протипухлинна активність, бактерійний лектин.

Вступ. Ліки, які належать до гетероциклічних систем, вважають найефективнішими протипухлинними лікарськими засобами [1–4]. Одним з перспективних шляхів пошуку засобів лікування пухлинної хвороби є створення нових антиметаболітів піримідинового обміну, здатних впливати на структуру та функції нуклеїнових кислот та малих активних молекул. Наявність цих речовин в організмі людини і обумовила актуальність дослідження їхньої ролі у фізіології макроорганізму [5–7]. Пошуки шляхів елімінації пухлинних клітин із множинною лікарською стійкістю продовжуються.

Мета дослідження: вивчення параметрів токсичності та протипухлинної активності оригінального хіміко-біологічного аддукту 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-брому-2'-хлороетилену та протипухлинного бактерійного лектину *Bacillus polytuxa* на моделі експериментального пухлинного росту – Саркомі 45.

У зв'язку із цим були поставлені наступні завдання: вивчити параметри гострої токсичності (LD_{50}) хіміко-біологічного аддукту у порівнянні із параметрами токсичності гетероциклічної та лектинової компоненти аддукту, дослідити здатність хіміко-біологічного аддукту гальмувати експериментальний пухлинний ріст Саркомі 45, індекс ефективності та дані щодо селезінкового ефекту.

Матеріал і методи дослідження. Об'єктами дослідження був хіміко-біологічний аддукт 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-брому-2'-хлороетилену та бактерійного лектину *Bacillus polytuxa* **102** КГУ з Української колекції мікроорганізмів ІМВ НАНУ (далі лектин **102**). Основні серії експериментальних досліджень проведенні на дорослих білих нелінійних мишах-самцях (маса тіла $(17,0 \pm 2,0)$ г та $(22,0 \pm 2,0)$ г) та щурах-самцях (маса тіла $160,0 \pm 20,0$ г), які утримувалися у віварії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Утри-

мання та досліди на тваринах проводили відповідно до правил “Європейської конвенції захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях” (Страсбург, 1986). Визначення протипухлинної активності здійснено згідно з рекомендаціями Державного Фармакологічного центру МОЗ України на моделі експериментального пухлинного росту – Саркомі 45. Шлях введення розчинів – внутрішньочеревний. Загальноприйнятим критерієм значення для речовин з протипухлинною активністю вважали відсоток гальмування росту пухлини понад 50 % [8, 9]. Кров та пухлина піддослідного щура-пухлиноносія були відібрані через 30 хв після введення сполук в терапевтичній дозі [8, 9]. Препарат порівняння – 5-фторурацил (5-ФУ). Статистичну обробку проводили за В. Б. Прозоровським та ін. [9].

Результати й обговорення. Отримані параметри токсичності хіміко-біологічного аддукту 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-брому-2'-хлороетилену та лектину **102**, а також гетероциклічної та лектинової компонент аддукту, показали, що за показниками середньотоксичних доз сполуки належать до малотоксичних. Значення їх LD_{50} коливаються в межах від 635 мг/кг до 248 мг/кг (табл. 1).

Вивчення протипухлинної активності на Саркомі 45 виявило виражений ефект у хіміко-біологічного аддукту 1,1-біс-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-брому-2'-хлороетилену та лектину **102** (82,0%) у дозі 35 мг/кг, в той час як відсоток гальмування росту пухлини при дії препарату порівняння 5-FU – 18,4 %. Здатність гальмувати експериментальний пухлинний ріст Саркомі 45 аддукту перевищує за протипухлинною дією у проведених дослідах препарат порівняння 5-FU у 4,46 раза. Індекс ефективності досліджуваного аддукту на Саркомі 45 дорівнював 5,56. Що стосується селезінкового

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

ефекту, то вищезазначений показник у тварин-носіїв пухлин знаходився в межах 0,71–0,77. Це пояснює відносно м'яку дію вказаних препаратів на систему кровотворення в умовно-лікувальних дозах. В цілому, пошук протипухлинних засобів на

основі комбінацій ряду гетероцикліческих сполук з бактерійними лектинами слід вважати перспективним новим напрямком, розвиток якого передбачає можливість одержання нових ліків з вираженою протипухлинною дією.

Таблиця 1. Параметри токсичності сполук у порівнянні з 5-ФУ

Сполука	ЛД ₅₀ , мг/кг
Лектинова компонента аддукту: лектин 102	248
Гетероцикліческа компонента аддукту: 1,1-bis-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-бromo-2'-хлороетилен	415
Хіміко-біологічний аддукт 1,1-bis-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-бromo-2'-хлороетилену та лектину 102	635
5-ФУ (препарат порівняння)	375

Висновки. 1. З метою отримання нових потенційних протипухлинних засобів створено оригінальний хіміко-біологічний аддукт на основі 1,1-bis-[5-бромопіримідин-2',4'-діон-1'-іл]-2-бromo-2'-хлороетилену та лектину *Bacillus polymyxa*.

2. Хіміко-біологічний аддукт біс-похідного піримідину та лектину є малотоксичним (ЛД₅₀: 635 мг/кг),

проявляє значущий протипухлинний ефект на Саркомі 45 з % гальмування пухлинного росту 82,0.

Перспективи подальших досліджень.

Новий хіміко-біологічний аддукт є перспективним для подальшого вивчення як малотоксична речовина з високою протипухлинною активністю на Саркомі 45.

ЛІТЕРАТУРА

1. Adjei A. A. Review of pharmacology and clinical activity of new chemotherapy agents for the treatment of colorectal cancer / A. A. Adjei // Clinical Pharmacology. – 1999. – Vol. 48. – P. 265–277.
2. Anderson N. Controversial issues in 5-fluorouracil infusion use. Dose intensity, treatment duration, and cost comparisons / N. Anderson, J. Lokich // Cancer. – 1992. – Vol. 70. – P. 998–1002.
3. Anttila M. I. Pharmacokinetics of fluorouracil after intravenous and oral administration / M. I. Anttila, E. A. Sotaniemi, M. I. Kairaluoma // Cancer Chemotherapy and Pharmacology. – 1983. – Vol. 10. – P. 150–153.
4. Baba H. State of the treatment for gastrointestinal cancer / H. Baba, S. Kohnoe, K. Endo // Gan To Kagaku Ryoho. – 2000. – № 27. – P. 1233–1246.
5. Клецкий М. Е. Структура и реакционная способность производных урацила / М. Е. Клецкий, Е. Б. Цупак, Д. А. Назаров // ХГС. – 2002. – № 8. – С. 1106–1108.
6. Noordhuis P. 5-fluorouracil incorporation into RNA and DNA in relation to thymidylate synthetase inhibition human colorectal cancer / P. Noordhuis, U. Holwerda // Annals. of Oncol. – 2004. – Vol. 15. – P. 1025–1032.
7. Longley D. B. Mechanisms of action of 5-fluorouracil / D. B. Longley, D. P. Harkin // Nature Rev. Cancer. – 2004. – Vol. 4. – P. 230–238.
8. Экспериментальная оценка противоопухолевых препаратов в СССР и США / [под ред. З.П. Софьиной, А.Б. Сыркина, А. Голдина, А. Кляйна]. – М. : Медицина, 1979. – 296 с.
9. Прозоровский В. Б. Экспресс-метод определения средней эффективности дозы и ее ошибки / В. Б. Прозоровский, В. П. Прозоровский, В. М. Демченко // Фармакол. и токсикол. – 1978. – Т. 41, № 4. – С. 407–509.

**INVESTIGATION OF THE TREATMENT'S POSSIBILITY OF SARCOMA 45
BY THE CHEMICAL-BIOLOGICAL ADDUCT OF THE BIS-[5-BROMOPYRIMIDINE-
2',4'-DIONO-1'-IL]-2-BROMO-2'-CHLOROETHYLENE AND BACTERIAL LECTIN**

© O. V. Velchynska

National Medical University by O. O. Bohomolets, Kyiv

SUMMARY. Investigation of the antimetabolites of pyrimidine's change which forwards as preformed compounds at the link of biosynthetic processes and brakes tumour's growth is more successful finding direction of new antitumour preparations. With a purpose of new potential antitumour preparation's obtaining chemical-biological adducts on the base of 1,1-bis-[5-bromopyrimidine-2',4'-dione-1'-il]-2-bromo-2'-chloroethylene and antitumour bacterial lectin *Bacillus polymyxa* was produced. It was discovered that chemical-biological adduct of bis-derivative of pyrimidine and bacterial lectin applies to a little toxic preparation (LD₅₀: 635 mg/kg) and demonstrates considerable antitumour effect upon to 82.0 % on Sarcoma 45 tumour. It confirms that new chemical-biological adduct is perspective for the future investigation as substance with a little toxicity and high antitumour activity on the Sarcoma 45.

KEY WORDS: pyrimidine, 5-bromouracile, antitumour activity, bacterial lectin.

Отримано 15.09.2014