

Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка
Луганський державний медичний університет

**ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ
І КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ**

Збірник наукових праць
Випуск 6 (108)

Київ - Луганськ
2011

Бічевська Р.Г., Германов В.Т. Зміни неферментативної ланки антиоксидантного захисту у жінок з невинощуванням вагітності у ранній термін.....	172
Зельоний І.І. Рівень простагландинів та циклічних нуклеотидів у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешіху в динаміці загальноприйнятого лікування.....	179
Іванова Л.М., Сидоренко Ю.В., Височин М.В., Пілієва О.В., Сабковська Х.О., Косюга Т.М. Вплив тівортину на ферментативну активність системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ішемічною хворобою серця.....	195
Клименко Н.М. Метаболическая и кардиопротективная эффективность телмисартана и кандесартана у больных с гипертонической болезнью и ожирением.....	202
Крутъко Е.Н. Изменение метаболизма, гемостаза и зритропозза у пострадавших с травматической болезнью, осложненной синдромом полиорганной дисфункции	225
Несен А.О. Специфика змін в нейтральних ліпідах при коморбідності хронічної хвороби нирок та атеросклерозу	232
Сердюк В.И. Состояние тиол-дисульфидной системы белков сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы.....	239
Соцька Я.А., Фролов В.М. Ефективність препарату урсодезоксихолової кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку Гепар-ПОС при лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності на тлі хронічного некалькульованого холецистита та його вплив на показники системи глутатіону.....	246
Торопчин В.І. Динаміка показників "метаболічної" інтоксикації у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі синдрому хронічної втоми при застосуванні комбінації енерліву та нуклекса.....	264
Труфанов С.Ю. Стан системи глутатіону у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи.....	278

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ФАРМАЦІЇ ТА
ФАРМАКОТЕРАПІЇ**

Ведерникова І.О. Аспекти розвитку магнітної нанофармації.....	287
Вельчинська О.В. Хімічно модифіковані похідні 5-нітроурацилу та їх протипухлинна активність.....	297
Дядичева Т.А., Сабадаш В.Е., Сысоїкина Т.В., Липатникова А.С. Применение антигомотоксического препарата Хепель-HEEL в комплексном лечении хронического некаменного холецистита у больных ишемической болезнью сердца с гиперлипидемией.....	306
Корнієнко В.І., Самура Б.А., Романенко М.І., Ладогубець О.В., Назаренко М.В. Залежність гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну.....	314
Круглова О.В., Теръошин В.О. Ефективность гепатозахисного препарата з артишоку Гепар-ПОС у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом подразненого кишечнику.....	324
Левицкая Г.В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф, Метелицына И.П. Результаты применения нейропротектора кортексин в послеоперационном периоде у больных с регматогенным отслойкой сетчатки	335
Макаревич В.А. Ефективність лікопіду в комплексній терапії герпетичного стоматиту.....	343
Налапко К.К. Вплив терапії цитратрігініном на клініко-біохімічні показники пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, поєднаним з хронічним простим бронхітом, на фоні ожиріння.....	352
Огарь С.В. Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в національному фармацевтичному університеті....	359
Опрошанська Т. В., Хворост О. П. Визначення кількісного вмісту кислоти аскорбінової та суми кислот органічних в сировині та густих екстрактах кореня і листя лопуха великого.....	367

35. Vizirianakis I. Nanomedicine and personalized medicine toward the application of pharmacotyping in clinical practice to improve drug-delivery outcomes / I. Vizirianakis // *Nanomedicine*. - 2011. - №7. - P. 11-17.

36. Zahn M. Magnetic fluid and nanoparticle applications to nanotechnology / M. Zahn // *Journal of Nanoparticle Research*. - 2001. - №3. - P. 73-78.

37. Zubarev A. Rheological properties of magnetic suspensions / A. Zubarev, L. Iskakova // *J. Phys. Condens. Matter*. - 2008. - № 20. - P. 38-41.

Резюме

Ведерникова І.О. Аспекти розвитку магнітної нанофармації.

Проведено аналіз експериментальних досліджень по використанню магнітних наночастинок у складі фармацевтичних препаратів. Відображене міждисциплінарний зв'язок нанотехнологій: магнітні рідини у техніці -магнітна нанофармація. Обґрунтовано напрямки розвитку магнітних рідин у медицині та фармації. Дано класифікація лікарських препаратів з магнітними наночастинками.

Ключові слова: магнітні наночастинки, лікарські препарати.

Резюме

Ведерникова И.А. Аспекты развития магнитной нанофармации.

Проведен анализ литературных данных экспериментальных исследований по использованию магнитных наночастиц в составе фармацевтических препаратов. Показана междисциплинарная связь нанотехнологий: магнитные жидкости в технике - магнитная нанофармация. Обоснованы направления развития магнитных жидкостей в медицине и фармации. Дано классификация лекарственных препаратов с магнитными наночастицами.

Ключевые слова: магнитные наночастицы, лекарственные препараты.

Summary

Vedernikova I.A. Aspects of development of magnetic nanopharmacy.

Analysis of the literature of experimental studies on the use of magnetic nanoparticles in the pharmaceutical preparations have been done. The interdisciplinary communication of nanotechnology was shown: magnetic fluid in technology - the magnetic nanopharmacy. The directions of development of magnetic fluids in medicine and pharmacy are substantiated. The drugs with magnetic nanoparticles were classified.

Key words: magnetic nanoparticles, drugs.

Рецензент: д.мед.н., проф.М.А.Мохорт

УДК 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96

ХІМІЧНО МОДИФІКОВАНІ ПОХІДНІ 5-НІТРОУРАЦИЛУ ТА ЇХ ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ

О.В. Вельчинська

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця
(Київ)

Вступ

Створення нових антиметаболітів піримідинового обміну, здатних впливати на структуру та функції нуклеїнових кислот та малих активних молекул залишається одним з перспективних шляхів пошуку засобів лікування пухлинної хвороби [1]. Наявність цих речовин в організмі людини і обумовила актуальність дослідження їхньої ролі у фізіології макроорганізму. Вивчається використання малих активних молекул для фармакопейних форм медичних біологічних препаратів з метою інгібіції пухлинного росту. Актуальність досліджень підтверджується чисельними роботами вітчизняної та світової літератури [1-3]. Останнім часом значно зросла кількість досліджень щодо синтезу нових похідних 5-фторурацилу та його хімічних аналогів, вивчення їхньої біологічної активності.

Дуже важливо те, що фторо(галогено)заміщені гетероциклічні молекули здатні виконувати роль відповідних синтонів в органічному синтезі. З цієї причини їх активно використовують для створення оригінальних біологічно активних молекул. Введення фторо(галогено)вмісних фармакофорів в гетероциклічну молекулу призводить до підвищення розчинності сполук в ліпідах та робить лікарські засоби ефективнішими у зв'язку із легкістю їх транспортування в організмі [4, 5]. При цьому зазначена увага до фторомістних фрагментів у нових молекулах передбачає підсилення антиметаболітічних властивостей сполук.

Мета даної роботи полягає в хімічній модифікації молекули 5-нітроурацилу з подальшим вивченням біологічної активності його синтезованих похідних, а саме: після конструювання потенційно

активних структур розроблено новий препаративний метод синтезу оригінальних гетероциклів на основі 5-нітроурацилу, а також фторвмістних синтонів - загального анестетика фторотану (2-бromo-1,1,1-трифторо-2-хлороетану) або 1,1-діетилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилену, досліджено параметри токсичності та протипухлинна активність нових похідних 5-нітроурацилу.

Матеріали та методи дослідження

Об'єкти дослідження: нові гетероциклічні моно- та біс-похідні, які було синтезовано на основі 5-нітроурацилу та фторотану або 1,1-діетилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилену, що використовували у якості фторовмістних синтонів. Абсолютні розчинники одержували перегонкою над P_2O_5 або металевим натрієм, перегонкою у вакуумі або простою перегонкою; сушили над сульфатом магнію безводним. Індивідуальність синтезованих сполук контролювали методом ТШХ на пластинах Silufol-254 в системі ацетонітрил-гексан 2:1. ГРХ виконували на газорідинному хроматографі "Perkin Elmer" з УФ-детектором (виробник "Perkin", Germany). ІЧ-спектри записували на спектрофотометрі UR-20 (виробник "Charles Ceise Hena", Germany). Спектри 1H ЯМР записували на приладах "Bruker WP-200" (виробник "Bruker", Switzerland), "Varian T-60" (виробник "Varian", USA) з робочою частотою 200-132 МГц в DMSO- d_6 з використанням тетраметилсилану як внутрішнього стандарту.

$N_{(1)}N_{(1)}\text{-}(2\text{''}-\text{бromo-2\text{''}-хлороетеніл})\text{-біс-(5\text{'}-нітроурацил)}$ (І).

Приготування розчину № 1. 0.25 г гідроксиду калію (0,0044 моль), 0.025 г дібензо-18-краун-6-ефіру в 20 мл сухого бензолову перемішують при температурі 60°C біля 15 хвилин до утворення на стінках хімічного реактора білого полімерного нальоту, тобто утворення калієвого комплексу з дібензо-18-краун-6-ефіром. Отриманий розчин охолоджують до кімнатної температури, додають до нього краплями розчин 0.87 г (0,0044 моль) фторотану в 20 мл сухого ефіру.

Приготування розчину № 2. 1.38 г (0,0088 моль) 5-нітроурацилу розчиняють в 40 мл сухого диметилформаміду при температурі 60°C в окремому хімічному посуді. Гарячий розчин № 2 додають краплями через ділильну лійку до розчину № 1, перемішують при температурі 60-80°C 1 годину (реакцій-

на суміш мутніє та при нагріванні стає червоно-коричневою), фільтрують у гарячому стані, охолоджують, відганяють простою перегонкою розчинники. Залишок - осад промивають 30 мл суміші діетиловий ефір - гексан (1:1) та сушать у вакуумі водострумного насосу. Сполука I кристалічний осад кремово-го забарвлення. Вихід 2.24 г (56,5%). Т пл. 290-295°C. Знайдено, %: C 26,67; H 1,02; N 17,79. $C_{10}H_4BrClN_6O_8$. Обчислено, %: C 26,59; H 0,89; N 18,60. ІЧ-спектр (KBr), см $^{-1}$: 550-690 (C-Hal), 1710, 1750 (C=O). 1H ЯМР: 8.861 (2H, с., 2 x $C_{(6)}H$), 10.226 (2H, с., 2 $N_{(3)}H$). Аналогічно синтезували сполуки: $N_{(1)}\text{-}(1\text{'},1\text{'}-\text{дифторо-2\text{'}-брому-2\text{'}-хлороетил})\text{-5\text{'}-нітроурацил}$ (ІІ), $N_{(1)}\text{-}(2\text{'}-\text{брому-1\text{'}-гідрокси-2\text{'}-хлороетеніл})\text{-5\text{'}-нітроурацил}$ (ІІІ) із 1.57 г (0,84 мл, 0,0079 моль) фторотану та 1.24 г (0,0079 моль) 5-нітроурацилу. Сполука II - кристалічний осад жовтого забарвлення. Вихід 1,26 г (48%). Т пл. 269-271°C. Знайдено, %: C 21,43; H 0,88; N 12,34. $C_6H_3BrClF_2N_3O_4$. Обчислено, %: C 21,55; H 0,90; N 12,55. ІЧ-спектр (KBr), см $^{-1}$: 550-690 (C-Hal); 1710, 1750 (C=O); 1370-1390 ($\gamma^s_{NO_2}$); 1550-1580 ($\gamma^{as}_{NO_2}$). 1H ЯМР: 7,238 (H, с., $C_{(6)}H$); 10,569 (H, с., $N_{(3)}H$). Сполука III - кристалічний осад жовтого забарвлення. Вихід 0,29 г (12%). Т пл. 264-268°C. Знайдено, %: C 22,84; H 0,86; N 13,38. $C_6H_3BrClN_3O_5$. Обчислено, %: C 23,09; H 0,96; N 13,46. ІЧ-спектр (KBr), см $^{-1}$: 550-690 (C-Hal); 1710, 1750 (C=O); 3200-3400 (OH); 1370-1390 ($\gamma^s_{NO_2}$); 1550-1580 ($\gamma^{as}_{NO_2}$). 1H ЯМР: 7,238 (H, с., $C_{(6)}H$); 10,569 (H, с., $N_{(3)}H$); 10,977 (H, с., OH). 1,1-діетилкарбокси-2-трифторометил-2-(5'-нітроуридин-N(1')-)етилен (ІV). Приготування розчину № 1. 6,13 г натрію металевого (0,268 моль) розчиняли в 250 мл метанолу безводного, додавали краплями через ділильну лійку 43,0 г діетилового ефіру малонової кислоти (40 мл; 0,268 моль) та 62,0 г трифторотової кислоти (40 мл; 0,543 моль) при перемішуванні реакційної суміші та нагріванні. Кип'ятили суміш протягом 6 годин, охолоджували до кімнатної температури, відганяли простою перегонкою розчинник. Залишок - скловидну масу білого кольору заливали діетиловим ефіром. Осад білого кольору (продукт A), що випадав, відфільтровували та використовували на наступній стадії реакції. Приготування розчину № 2.

8,0 г (0,0287 моль) продукту А розчиняли у 55 мл сухого дихлоретану при кімнатній температурі, додавали 6 г (0,0287 моль) п'ятихлористого фосфору. Реакційна суміш нагрівалася та набувала молочного забарвлення. Гарячий розчин перемішували з кип'ятінням 5 годин, охолоджували; осад, що утворився відфільтровували та промивали дихлоретаном, відганяли розчинник простою перегонкою. Залишок - масло очищували перегонкою у вакуумі (продукт В). Вихід 6,31 г (80%). Т. кип. 56-59°C (25 мм рт. ст.), n_{D}^{25} 1,3010. Знайдено, %: С 39,36; Н 3,67; F 20,75. $C_9H_{10}ClF_3O_4$. Обчислено, %: С 39,37; Н 3,64; F 20,76. Приготування розчину № 3. До суміші 2,26 г (0,014 моль) 5-нітроурацилу в суміші 200 мл піридину та 50 мл ДМФА безводних та 1,42 г (2,5 мл; 0,014 моль) триетиламіну безводного додають по краплям 3,8 г (0,014 моль) продукту В у 10 мл ДМФА безводного при перемішуванні реакційної суміші та нагріванні до 60-70°C. Кип'ятять суміш протягом 10 годин (реакційна суміш темно-червоного забарвлення), фільтрують гарячий розчин та відділяють осад $N(C_2H_5)_3 \cdot xHCl$, відганяють розчинники у вакуумі. Залишок - масло жовтого забарвлення заливають гексаном та кип'ятять, зливають гексан декантациєю, заливають ацетоном. Осад блідо-жовтого забарвлення випадав із ацетону. Т пл. 156-159°C, вихід 2,5 г (45%). Знайдено, %: С 41,0; Н 3,35; N 11,09. $C_{13}H_{12}F_3N_3O_8$. Обчислено, %: С 39,51; Н 3,05; N 10,63. ІЧ-спектр (KBr), см⁻¹: 400, 415, 470, 560 (-CF₃); 600-800 (Cycl.); 905, 995, 1180, 1230, 1295 (-CF₃); 1050-1150 (-OCH₃, -OC₂H₅); 1300-1600 (Cycl.); 1315, 1600 (C=C); 1710, 1750 (C=O); 1370 (-NO₂); 3010-3080 (Cycl.). ¹H ЯМР: 1.005-1.355 (6Н, м., J³H,H 7.0 Гц, 2CH₃); 3.737-4.315 (4Н, м., J³H,H 7.0 Гц, 2OCH₂); 7.78 (1Н, т., J²H,H 10.0 Гц, -C₍₆₎H (Cycl.)); 11.69 (1Н, с., -N₍₃₎H (Cycl.)).

Під час проведення хіміко-біологічних досліджень нами було відібрано серед значної кількості синтезованих преформованих піримідинів та досліжені сполуки із значущою протипухлинною дією [6].

Слід зазначити, що в молекулах більшості із цих сполук гетероциклічні фрагменти пов'язані залишком молекули загального анестетика фторотану, який широко використовується в хірургічній онкологічній практиці [7, 8].

Гостру токсичність (ЛД₅₀) вивчено у порівнянні з препаратором 5-фторурацил. Протипухлинну активність нової сполуки $N_{(1)},N_{(1)}-(2''\text{-брому-2''-хлороетеніл})\text{-біс-(5-нітроурацил)}$ (**I**) досліджена з використанням операційного та біопсійного матеріалу з пухлиною мозку людини.

Дослідження параметрів гострої токсичності та протипухлинної активності нових сполук виконано в Інституті фармакології та токсикології АМН України. Вивчення гострої токсичності (ЛД₅₀) проведено на білих нелінійних миших - самцях з масою тіла 22+2 г при підшкірному шляху введення. Результати досліду обраховано у альтернативній формі на 14 добу після введення. Статистична обробка проведена за [9]. Оскільки структурних аналогів синтезованих сполук в літературі не описано, препаратом порівняння був відомий протипухлинний лікарський засіб 5-фторурацил. Доза речовини при підшкірному шляху введення становила від 200 до 600 мг/кг. У піддослідних тварин спостерігалася тонічні судоми впродовж 1-2 годин, блювання.

Отримані результати та їх обговорення


За новими, розробленими нами методами синтезу, взаємодією фторотану у якості фторовмісного синтону з 5-нітроурацилом у молярному співвідношенні 1:2 та 1:1 в системі розчинників (бензол-ДМФА-діетиловий ефір) в умовах міжфазного каталізу дібензо-18-краун-6-ефіром (лужне середовище) синтезовано нові моно- та біс-похідні 5-нітроурацилу з фармацевтичними групами =C=CBrCl, -CF₂-CHBrCl, -(HO)C=CBrCl (**I-III**), а при взаємодії іншого фторовмісного синтону 1,1-діетилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилетилену з 5-нітроурацилом в еквімолярних кількостях в системі розчинників (діетиловий ефір-ДМФА-гексан-ацетон) синтезовано оригінальне похідне **IV** наступної формули (схема 1).

Дослідження гострої токсичності синтезованих сполук **I**, **II** (табл. 1) показало, що похідні 5-нітроурацилу **I**, **II** більш токсичні (у 0,49-0,69 рази), ніж 5-фторурацил. Значення їх ЛД₅₀ знаходяться в межах від 185 мг/кг до 262 мг/кг.

Протипухлинна дія синтезованих сполуки **I** досліджена в експериментах з використанням пухлини головного мозку людини (операційний та біопсійний матеріал) в підкапсульному тесті за

методом Богдана. При лікуванні гліобластоми людини критерієм значущості був відсоток гальмування росту гетеротранспланту глюми людини понад 25%. Курс лікувальних вливань становив 6 введень через добу при внутрішньоочеревинному шляху введення, в інтервалі доз 1/4-1/5 ЛД₅₀. Результати обраховано через 24 години після закінчення лікування [10].

Схема 1



Таблиця 1
Параметри токсичності сполук I, II у порівнянні
з 5-фторурацилом

№ п/п	Сполука	ЛД ₅₀ , мг/кг
1.	N _(D) N _(I') -(2"-бromo-2"-хлороетеніл)-біс-(5-нітроурацил) (I)	262
2.	N _(D) -(1',1'-дифторо-2'-бromo-2'-хлоростил)-5-нітроурацил (II)	185
3.	5-Фторурацил (препарат порівняння)	375

Виявлено, що протипухлинна активність біс-похідного 5-нітроурацилу I значно перевищує прийнятій критерій значущості (>25,0% гальмування пухлинного росту). Маса гетеротранспланту злойкісної глюми після дії біс-похідного 5-нітроурацилу I зменшилася до 1,86±0,091 мг, що відповідає за результатами морфологічного контролю 30,0% гальмування росту пухлини. Це в 1,2 рази більше прийнятого критерію

активності при лікуванні гліобластоми 25%, що підтверджено при проведенні морфологічного контролю. При порівняльно-му гістологічному дослідження клітинно-тканевих реакцій пухлини при лікуванні потенційною противухлиною сполукою - біс-похідним 5-нітроурацилу I в умовах субклітинного тестування встановлено залежність між вираженими регресивними змінами пухлини та рівнем гальмування їх росту. Зазначений ефект вважається вираженим щодо подальшого вивчення біс-похідного 5-нітроурацилу I при пухлинах головного мозку.

Визначення одного з головних фармакологічних індексів похідних 5-нітроурацилу I, II - гострої токсичності показало, що синтезовані сполуки відносяться до малотоксичних: значення ЛД₅₀ їх знаходяться в межах від 185 мг/кг до 262 мг/кг. Вони у 0,49-0,69 рази більш токсичні, ніж препарат порівняння 5-фторурацикл. Виявлено, що біс-похідне 5-нітроурацилу I має значну противухлину дію відносно гетеротранспланту глюми людини (30,0%), що у 1,2 рази більше прийнятого критерію активності при лікуванні гліобластоми 25%.

Висновки

1. За новими, розробленими нами методами синтезу, взаємодією фторотану або іншого фторовмісного синтону 1,1-діетилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилетилену з 5-нітроурацилом в молярному співвідношенні 1:2 або еквімолярних кількостях, в умовах міжфазного каталізу дibenzo-18-краун-6-ефіром, синтезовано нові моно- та біс-похідні 5-нітроурацилу з фармакофорними групами.

2. Встановлено, що синтезовані моно- та біс-похідні 5-нітроурацилу відносяться до малотоксичних: значення ЛД₅₀ їх знаходяться в межах від 185 мг/кг до 262 мг/кг.

3. При використанні пухлини головного мозку людини (операційний та біопсійний матеріал) в підкапсульному тесті за методом Богдана, на підставі результатів експериментально-морфологічних досліджень зареєстровано виражений противухлиний ефект біс-похідного 5-нітроурацилу з відсотком гальмування пухлинного росту 30,0% (критерій значущості ≥ 25%).

Література

1. Noordhuis P. 5-fluorouracil incorporation into RNA and DNA in relation to thymidilate synthetase inhibition human colorectal cancer / P. Noordhuis, U. Holwerda // Annals. of oncol. - 2004. - Vol. 15. - P. 1025-1032.
2. Adjei A. A review of pharmacology and clinical activity of new chemotherapy agents for the treatment of colorectal cancer / A. Adjei // Clin. Pharmacol. - 1999. - Vol. 48. - P. 265-277.
3. Longley D.B. Mechanisms of action of 5-fluorouracil / D.B. Longley, D.P. Harkin // Nature Rev. Cancer. - 2004. - Vol. 4. - P. 230-238.
4. Барлоу Р. Введение в химическую фармакологию / Р. Барлогу. - М.: Изд. ин. лит., 1959. - С. 107.
5. Ягупольский Л.М. Ароматические и гетероциклические соединения с фторсодержащими заместителями / Л.М. Ягупольский. - Киев: Наукова думка, 1988. - С. 90-105.
6. Welchinska Hel.V. Biological activity of bacterial lectins and their molecular complexes with heterocyclic bis-adducts / Hel.V. Welchinska, B. Piecuszak, E.A. Kovalenko, N.I. Sharykina [e.a.] // Мікробіол. журн. - 2003. - Т.65, № 6. - С. 20-25.
7. Brody G.L. Halothane anesthesia as a possible cause of massive hepatic necrosis / G.L. Brody, R.B. Sweet // Anesthesiology. - 1963. - Vol. 24. - P. 29-37.
8. Brown B.R. Biotransformation and hepatotoxicity of halothane / B.R. Brown, I.G. Sipes // Biochem. Pharmacol. - 1977. - Vol. 26. - P. 2091-2094.
9. Прозоровский В.Б. Экспресс метод определения средней эффективности дозы и ее ошибки / В.Б. Прозоровский, В.П. Прозоровский, В.М. Демченко // Фармакол. и токсикол. - 1978. - Т. 41, № 4. - С. 407-509.
10. Экспериментальная оценка противоопухолевых препаратов в СССР и США / [под ред. З.П. Софьиной, А.Б. Сыркина, А. Голдина, А. Кляйна]. - М.: Медицина, 1979. - 296 с.

Резюме

Вельчинська О.В. Хімічно модифіковані похідні 5-нітроурацилу та їх протипухлинна активність.

Описано нові препаративні методи синтезу в умовах каталізу 18-краун-6-комплексом оригінальних гетероциклів на основі 5-нітроурацилу та фторовмісних синтонів - фторотану та 1,1-діетилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилетилену. Встановлено, що синтезовані моно- та біс-похідні 5-нітроурацилу відносяться до малотоксичних: значення LD_{50} їх знаходяться в межах від 185 мг/кг до 262 мг/кг. Виявлено значущий протипухлинний ефект біс-похідного 5-нітроурацилу на гетеротрансплантах злойкісної глюоми людини з відсотком гальмування росту пухлини 30,0% (критерій значущості $\geq 25\%$).

Ключові слова: 5-нітроурацил, фторотан, пухлина, глюома, токсичність.

Резюме

Вельчинская Е.В. Химически модифицированные производные 5-нитроурацила и их противоопухолевая активность.

Описаны новые препаративные методы синтеза в условиях катализа 18-краун-6-комплексом оригинальных гетероциклов на основе 5-нитроурацила и фторосодержащих синтонов - фторотана и 1,1-дизтилкарбокси-2-хлоро-2-трифторометилэтилена. Установлено, что синтезированные моно- и бис-производные 5-нитроурацила относятся к малотоксичным: значения LD_{50} их находятся в интервале от 185 мг/кг до 262 мг/кг. Обнаружен значительный противоопухолевый эффект бис-производного 5-нитроурацила на гетеротранспланатах злокачественной глиомы человека с процентом торможения роста опухоли 30,0% (критерий значимости $\geq 25\%$).

Ключевые слова: 5-нитроурацил, фторотан, опухоль, глиома, токсичность.

Summary

Welchinska E.V. Chemical modified derivatives of 5-nitouracile and its antitumour activity.

A new convenient methods for the preparation with 18-crown-6-complex as catalyst of original heterocyclic compounds on the base of 5-nitouracile and fluoric containing sintones - fторотан and 1,1-diethylcarboxy-2-chloro-2-trifluoromethylethylene was described. It was discovered that mono- and bis-derivatives of 5-nitouracile which synthesized applies to a little toxic preparations: its LD_{50} are at the interval from 185 mg/kg to 262 mg/kg. A strongly antitumour effect of bis-derivative of 5-nitouracile on the heterotransplantates of man's glioma cancer with percents of growth relaxation of cancer 30,0% has been discovered (the criteria of considerable are $>25\%$).

Key words: 5-nitouracile, fторотан, tumour, glioma, toxicity.

Рецензент: д. мед. н., проф. В.Д. Лук'янчук