

ISSN 0132-6244

и м и я

етероциклических  
с оединений

Chemistry of Heterocyclic Compounds

Е. Вельчинская, Б. Пецушак<sup>a</sup>, А. Рогаль

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
N-ЗАМЕЩЕННЫХ МАЛЕИНИМИДОВ


Проведены реакции N-замещенных малеинимидов с аминоурацилами и производными анилина. Структура синтезированных соединений подтверждена данными элементного анализа, УФ, ИК и ЯМР <sup>1</sup>H спектрами. Изучены физико-химические свойства новых синтезированных соединений, их токсичность и биологическая активность.

Ключевые слова: малеинимид, урацил, реагент группового осаждения.

Согласно литературным данным, в результате нуклеофильного присоединения молекулы аминоурацила или замещенного анилина к N-замещенным малеинимидам возможно образование физиологически активных соединений, которые могут обладать противоопухолевым, противосудорожным или противомикробным действием [1–3].


Ранее нами был описан метод получения соединений такого типа, отмечались достоинства данной реакции, легкость ее протекания и простота обработки конечных продуктов [4].

Целью данного исследования являются синтез новых соединений 1–4 с потенциальной противосудорожной активностью, структурной основой которых являются молекулы 5-аминоурацила, 6-аминотиоурацила или *m*-этиланилина, с одной стороны, и N-фенилзамещенных малеинимидов, с другой стороны. В результате нуклеофильного присоединения *m*-этиланилина по двойной связи N-фенилмалеинимида получено соединение 1:



Считается, что малеинимиды взаимодействуют с ароматическими аминами с образованием промежуточных донорно-акцепторных комплексов, которые далее превращаются в производные ариламиносукцинимидов [5].

Использование в качестве ароматических аминов 5-аминоурацила и 6-аминотиоурацила позволило исследовать реакционную способность N-замещенных малеинимидов в отношении гетероциклических соединений:



2 R = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br-*p*, 3 R = Ph, 4 R = C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OMe-*p*

Реакции проводили в системе растворителей изопропиловый спирт–вода, 1:1.5, при нагревании реакционной смеси от 4 до 21 ч. Варьирование условий проведения реакций, в частности, замена указанной системы растворителей на систему этиловый спирт–вода, 1:1.5, и промывание продуктов реакций при фильтровании в вакууме сухим гексаном без перекристаллизации позволили получить соединения 1–4 с выходами 30–50%.

Подобно бензолу УФ спектр соединения 1 имеет две полосы: интенсивную в коротковолновой области и малоинтенсивную в длинноволновой области. УФ спектры соединений 2–4 характеризуются общим показателем – присутствием трех  $\lambda_{\text{max}}$ , положение которых колебается в широком интервале (208–292 нм) в связи с сопряжением фрагмента молекулы урацила с дополнительными хромофорами – N-фенилзамещенным циклом сукцинимида, группами C=O и вторичной аминогруппой (табл. 1).

В ИК спектрах соединений 1–4 в области 600–900 см<sup>-1</sup> наблюдаются интенсивные полосы неплоских деформационных колебаний C–H ароматических колец, в то же время валентные колебания связей C–C бензольных ядер при 1585–1600 и 1400–1500 см<sup>-1</sup> идентифицировать невозможно, так как данные области спектра близки к колебаниям связи группы C=C, >N–H. Полосы  $\delta_{\text{NH}}$  наблюдаются в области 1450, 1490, 1540 см<sup>-1</sup> в зависимости от того, с каким заместителем связана вторичная группа >N–H в молекулах. Валентные колебания карбонильных групп C=O соединений 1–4 проявляются высокointенсивным максимумом в области 1630–1750 см<sup>-1</sup> (две полосы) и являются наиболее характеристичными, так как другие полосы в данной области практически отсутствуют.

Кроме того, в ИК спектре соединения 2 в низкочастотной области спектра можно легко определить полосу связи C–Br (505–550 см<sup>-1</sup>) высокой интенсивности. Связь S–H в ИК спектрах соединений 3, 4 легко

Характеристики синтезированных соединений 1–4

Таблица 1

Соеди- нение	Брутто- формула	Найдено, %		УФ спектр, $\lambda_{\text{max}}$ , нм (EtOH)	ИК спектр, $\nu, \text{см}^{-1}$	Спектр ЯМР $^1\text{H}$ , $\delta, \text{м. л.} (J, \text{Гц})$	Выход, %
		C	H				
1	$\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_2$	72.88 73.40	6.02 6.11	10.40 9.51	110–114	211, 231, 235 620–900 (C–H, Ph), 1450, 1490 (>N–H), 1700, 1710 (C=O), 2926 ( $\text{C}_2\text{H}_5$ ) 7.27–7.63 (5H, m, $\text{C}_6\text{H}_5$ )	1.23 (3H, t, $^3J = 7.2$ , $\text{CH}_3$ ); 2.45, 3.26 (2H, два м, $\text{CH}_2$ ); 4.48 (1H, кв, $^3J = 0.8$ , HCN); 4.83 (1H, д, $^3J = 5.2$ , NH); 6.05 и 7.08 (2H, два м, $\text{COCH}_2$ ); 6.42–6.68 (4H, м, $\text{C}_6\text{H}_4$ ); 50
2	$\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{BrN}_4\text{O}_4$	43.85 44.23	3.20 2.92	13.82 14.73	270–275	218, 236, 252, 267 505, 550 (Br), 600–900 (C–H, Ph), 1490 (>N–H), 1660, 1710, 1750 (C=O) 208, 254, 280 650–900 (C–H, Ph), 1540 (>N–H), 1630–1710 (C=O), 2900 (SH), 3240–3600 (OH)	2.72 и 3.18 (2H, два м, $\text{CH}_2$ ); 4.51 (1H, с, HCN); 5.11 (1H, д, $^3J = 5.2$ , NH); 6.66 (1H, с, $\text{C}_{(5)}\text{H}$ ); 7.26, 7.72 (4H, два м, $\text{C}_6\text{H}_4$ ); 10.31 (1H, с, $\text{N}_{(3)}\text{H}$ ); 11.25 (1H, с, $\text{N}_{(4)}\text{H}$ ) 44
3	$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{N}_4\text{O}_3\text{S}$	52.80 53.15	2.96 3.82	17.30 17.71	212–215	210, 242, 292 258–260 16.02 16.17	2.73 и 3.30 (2H, два м, $\text{CH}_2$ ); 3.40 (1H, с, HS); 4.53 (1H, кв, $^3J = 0.8$ , HCN); 5.1 (1H, д, $^3J = 5.2$ , NH); 5.35 (1H, с, H-5); 7.32–7.50 (5H, м, $\text{C}_6\text{H}_5$ ); 11.48 (1H, уш. с, OH) 40
4	$\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}_4\text{S}$	51.88 52.02	4.00 4.07			3.05 и 3.28 (2H, два м, $\text{CH}_2$ ); 3.38 (1H, с, HS); 3.79 (3H, с, $\text{OCH}_3$ ); 4.65 (1H, кв, $^3J = 0.8$ , HCN); 5.20 (1H, д, $^3J = 5.2$ , NH); 6.35 (1H, с, H-5); 7.05–7.24 (4H, м, $\text{C}_6\text{H}_4$ ); 11.41 (1H, уш. с, OH) 32	

Таблица 2

## Качественные реакции соединений 1–4 в сравнении с сукцинимидом

Сукцинимид	1	2	3	4
<i>Реакция с нитратом серебра</i>				
—	—	Светло-желтый осадок		
<i>Реакция с нитропруссидом натрия</i>				
Ярко-желтое окрашивание, при добавлении HCl интенсивность снижается	—	—	Лимонно-желтый цвет, при добавлении HCl — изумрудно-зеленое окрашивание	Желтый цвет, при добавлении HCl — малахитово-зеленое окрашивание
<i>Реакция с хлоридом железа(III)</i>				
Оранжево-красный осадок	Оранжево-красный осадок	Красный осадок	Красный осадок	Красный осадок
<i>Реакция с дихроматом калия</i>				
—	—	Оранжевый раствор	Оранжевый раствор	Оранжевый раствор
<i>Реакция с реагентом Несслера</i>				
При нагревании выпадает ярко-желтый осадок, который при стоянии зеленеет	—	—	—	Ярко-желтое окрашивание
<i>Реакция с ацетатом свинца, NaOH</i>				
—	—	Белый осадок, который быстро исчезает	Белый осадок, который быстро исчезает	Белый осадок, который быстро исчезает
<i>Реакция с пикриновой кислотой</i>				
—	Лимонное окрашивание	—	—	—
<i>Реакция с 10% NaOH при нагревании</i>				
Выделение аммиака, посинение лакм. бумаги	—	—	—	—
<i>Реакция с MeOH, Co(AcO)<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub>, NaOH</i>				
Сине-фиолетовое окрашивание	Сине-фиолетовое окрашивание	Интенсивное сине-фиолетовое окрашивание	Интенсивное сине-фиолетовое окрашивание	Фиолетовое окрашивание
<i>Реакция с резорцином и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></i>				
—	При нагревании желтый раствор, при охлаждении образуется розово-серый осадок	Красно-оранжевый раствор	Красно-оранжевый раствор	Желтый раствор

идентифицируется в области 2810–2900 см<sup>-1</sup>, практически свободной от других полос, но наблюдается их смещение в высокочастотную область (теоретическая область 2550–2600 см<sup>-1</sup>) в связи с влиянием гетероциклического кольца молекулы тиоурацила (табл. 1).

Спектры ЯМР <sup>1</sup>H соединений 1–4 имеют сигналы в виде мультиплетов при 6.43–7.72 м. д., что соответствует протонам ароматического кольца, и характерные сигналы в виде синглета при 5.10–5.20 м. д. протона замещенной вторичной группы NH.

В спектре ЯМР <sup>1</sup>H соединения 2 наблюдаются сигналы протонов при N-1 и N-3 фрагмента урацила в области 10.31 и 11.25 м. д. в виде синглетов. Спектры соединений 3, 4 имеют сигнал в виде синглета при 3.40–3.42 м. д., протона группы SH молекулы тиоурацила и уширенный синглет при 11.41–11.48 м. д. протона группы OH тиоурацила (табл. 1).

С целью качественного определения синтезированных соединений 1–4 разработаны методики цветных реакций, которые сопоставлены с качественными реакциями вещества сравнения – сукцинимида (табл. 2).

Примером одной из выполненных реакций может быть реакция с ацетатом кобальта в метаноле, в результате которой соединения 1–4 аналогично сукцинимиду дают сине-фиолетовое окрашивание [6].

Также был найден ряд других цветных реакций на соединения 1–4 (табл. 2).

Для соединений 2 и 3 в Институте фармакологии и токсикологии АМН Украины проведен первичный лабораторный скрининг по определению противосудорожной активности, а также установлена токсичность по методу Прозоровского на белых лабораторных мышах и крысах [7].

Соединения 2, 3 малотоксичны (2 – LD<sub>50</sub> 708 (620–800), 3 – LD<sub>50</sub> >2000 мг/кг) и противосудорожной активности не проявляют. Соединение 2 потенцирует судорожные эффекты.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектры ЯМР <sup>1</sup>H соединений 1–4 записаны на приборах Bruker WP-200 и Gemini-200 (200 МГц) в ДМСО-d<sub>6</sub>, внутренний стандарт ТМС. ИК спектры записаны на спектротометре UR-20 в таблетках КBr. ТСХ выполнена на пластинах Silufol-254. УФ спектры соединений 1–4 записаны в растворе этилового спирта на спектрофотометре Mel Temp II (USA).

**N-Фенил-3-(3-этилфениламино)сукцинимид (1).** К раствору 8 ммоль N-фенилмалеинимида в 40 мл изопропилового спирта добавляют при перемешивании 8.5 ммоль m-этиланилина при комнатной температуре. Реакционную смесь нагревают при температуре 80–90 °C в течение 21 ч. Маслообразный продукт, полученный после упаривания растворителя, заливают смесью гексан–эфир, 1:1. Образовавшийся темно-желтый осадок отфильтровывают, промывают сухим гексаном, сушат на воздухе.

**N-(n-Бромфенил)-3-(1H-2,4-диоксо-1,3-дигидропиримидин-5-иламино)сукцинимид (2).** К горячему раствору 1.9 ммоль N-n-бромфенилмалеинимида в 50 мл изопропилового спирта добавляют по каплям раствор 2 ммоль 5-аминоурацила в 450 мл смеси вода–изопропиловый спирт, 1:1.5, нагревают при температуре 80–90 °C при перемешивании 14 ч. Осадок горчичного цвета, который выпадает при охлаждении, отфильтровывают, промывают сухим гексаном, сушат на воздухе.

Соединения 3 и 4 получают аналогично.

**Приготовление растворов для проведения качественных реакций.** Готовят 1% раствор соединения 1–4 в дистиллированной воде, нагревают на водяной бане, охлаждают, фильтруют, проводят качественные реакции. Раствор сукцинида готовят аналогично без нагревания.

**Методики проведения реакций.**

**Реакция с нитратом серебра.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 (соединение 2) используют после сплавления его с металлическим натрием, которое проводят согласно методике [8] добавляют 2–3 капли 1% раствора  $\text{AgNO}_3$ .

**Реакция с нитропруссидом натрия.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 1 каплю 10% раствора  $\text{NaOH}$  (контроль – фенолфталеин), 5–6 капель 1% раствора  $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{NO})(\text{CN})_5]$ , затем добавляют 5–6 капель конц.  $\text{HCl}$ .

**Реакция с хлоридом железа(III).** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 1 каплю 10% раствора  $\text{NaOH}$  и 2–3 капли 1% раствора  $\text{FeCl}_3$ .

**Реакция с дихроматом калия.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 1–2 капли 10% раствора  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  в 50% растворе  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

**Реакция с реагентом Несслера.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 2–3 капли реагента Несслера.

**Реакция с ацетатом свинца.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 1–2 капли 10% раствора  $\text{NaOH}$  и 5–6 капель 10% раствора  $\text{Pb}(\text{OAc})_2$ .

**Реакция с пикриновой кислотой.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 3–4 капли 0.5% раствора пикриновой кислоты.

**Реакция с 10%  $\text{NaOH}$  при нагревании.** К 3–5 каплям 1% раствора соединения 1–4 добавляют 2–3 10% раствора  $\text{NaOH}$ , нагревают на водяной бане, подносят к отверстию пробирки лакмусовую бумагу.

**Реакция с метанолом, уксуснокислым кобальтом, хлоридом кальция, гидроксидом натрия.** К 0.5 мл 1% раствора соединения 1–4 добавляют 3 мл метанола, затем последовательно добавляют 0.05 мл 10% водного раствора  $\text{Co}(\text{OAc})_2$ , 0.05 мл 10% водного раствора  $\text{CaCl}_2$  и 0.1 мл 10% раствора  $\text{NaOH}$ .

**Реакция с резорцином и серной кислотой.** К 0.5 мл 1% раствора соединения 1–4 добавляют 1 мл 10% свежеприготовленного раствора резорцина в 10% растворе  $\text{NaOH}$  и 0.2 мл конц.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Нагревают на водяной бане.

Цветные реакции с препаратом сравнения – сукцинидом проводят аналогично.

*Авторы благодарят за оказанную помощь в проведении медико-биологических исследований специалистов Института фармакологии и токсикологии АМН Украины (Киев).*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. M. Abou-Charbia, U. R. Patel, M. B. Webb, *J. Med. Chem.*, **31**, 1382 (1988).
2. D. A. Cooncy, H. A. Milman, R. G. Cable, *Biochem. Pharmacol.*, **27**(2), 151 (1978).
3. V. Balasubramaniyan, P. Balasubramaniyan, A. S. Shaikh, *Tetrahedron*, **42**, 2731 (1986).
4. Е. В. Вельчинская, И. И. Кузьменко, Л. С. Кулик, *Хим.-фарм. журн.*, № 3, 40 (1999).
5. M. Farcash, R. Istratolu, *Rev. Roum. Chim.*, **15**, No. 12, 253 (1970).
6. *British Pharmacopoeia*, CD-ROM, 3 (1999).
7. В. Б. Прозоровский, В. П. Прозоровская, В. М. Демченко, *Фармакология и токсикология*, 497 (1978).

Национальный медицинский университет  
им. А. А. Богомольца, Киев 03057, Украина  
e-mail: elena\_wuu@ukr.net

Поступило 28.11.2003  
После переработки 20.02.2007

<sup>a</sup>Wyeth Whitehall Export GmbH,  
Вена A-1150, Австрия