

оглядово-аналітичний аналіз сучасних тенденцій удосконалення лікувально-профілактичних заходів післяпологової кровотечі у жінок із повторним кесаревим розтином

С. І. Ахrameєв

КНП «Перинатальний центр м. Києва»

DOI: 10.52705/2788-6190-2025-02.1-02

УДК 616.33-002.5-085.6:618.74

Післяпологова кровотеча (ППК) є однією з провідних причин материнської захворюваності та смертності, особливо серед жінок, які перенесли повторний кесарів розтин. У зв'язку зі зростанням частоти оперативних втручань у су-часному акушерстві, вивчення ефективних методів профілактики та лікуван-ня ППК набуває особливої актуальності. Мета дослідження: проаналізувати сучасні тенденції вдосконалення лікуваль-но-профілактичних заходів післяпологової кровотечі у жінок із повторним кесаревим розтином та оцінити ефективність інноваційних підходів до їх по-передження і лікування. Матеріали та методи. Проведено систематичний аналіз наукової літера-тури, клінічних досліджень і рекомендацій, опублікованих з 2020 по 2025 рік, із використанням баз даних Scopus, PubMed, Web of Science, Google Науковець та український медичний джерел. Оцінено ефективність сучасних медикаментозних, хірургічних та інноваційних методів, зокрема викорис-тання карбетоцину, транексамової кислоти, технік компресійного ушиван-ня матки, балонної тампонади, REBOA, алгоритмів прогнозування та персо-налізованих підходів. Результати. Встановлено, що застосування карбетоцину дозволяє знизити середню крововтрату на 180 мл порівняно з окситоцином, а комбінована те-рапія (мізопростол + окситоцин) – на 35%. Хірургічні інновації, зокрема метод «Ранець» та вакуумна тампонада, виявили понад 90% ефективності у профі-лактиці ППК. Прогностичні моделі та системи на базі ШІ підвищують точність виявлення ризику кровотеч до 88–95%. Висновки. Комплексний підхід, що включає медикаментозну терапію, орга-нозберігаючі хірургічні техніки, інноваційні прогностичні моделі та індивіду-алізовану стратегію ведення пацієнток, дозволяє суттєво знизити рівень післяпологових ускладнень і покращити якість акушерської допомоги жінкам із повторним кесаревим розтином.

Ключові слова: післяпологова кровотеча, повторний кесарів розтин, профілакти-ка, карбетоцин, інноваційні технології, REBOA, прогнозування.