

ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРИ МІСЦЕВОМУ ЗАСТОСУВАННІ ФЕНОЛУ В ДІТЕЙ З БОЛЕМ У ГОРЛІ

Луташев В.І., Половинка В.О.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Вступ. Біль у горлі у дітей є поширеною проблемою, яка може бути викликана різними чинниками. Найпоширенішими причинами болю в горлі у дітей є вірусні інфекції, такі як риновіруси, аденовіруси, інфлюенцавіруси та інші. Бактеріальні інфекції, зокрема стрептококова інфекція, також можуть спричинити гострий фарингіт. У зв'язку з тим, що гострий фарингіт є поширеною проблемою у дітей, важливо враховувати специфіку їхнього організму та вибирати оптимальні препарати для лікування.

Найпоширенішою причиною болю в горлі у дітей є вірусний фарингіт. Найчастіше згадується бактеріальний збудник, β -гемолітичний стрептокок групи А, також відомий як БГСА. Більшості пацієнтів не потрібна термінова антибіотикотерапії, оскільки вона зазвичай само обмежується, її важко відрізнити від вірусної інфекції та її важко діагностувати. Якщо у дітей виникає біль у горлі, їм слід призначати антибіотики, оскільки вони мають високий ризик розвитку гострої ревматичної лихоманки (ГРЛ). Це стосується будь-яких додаткових клінічних ознак, які можуть бути присутніми. Орасептики, такі як препарати фенолу або таблетки для горла, можуть бути корисні при лікуванні гострих фарингітів у дітей.

Мета. Здійснити клініко-фармацевтичне оцінювання раціональності вибору та застосування фенолу при болю в горлі у дітей, а також сформулювати алгоритм дій якісної й ефективної фармацевтичної опіки.

Матеріали і методи. Нами були обстежені педіатричні пацієнтів із болем і горлі, які застосовували у якості моно- чи комплексної терапії ЛЗ фенолу.

Результати. Фенол часто використовується для лікування симптомів болю в горлі у дітей, особливо у формі спрею. можливо як довгострокове, так і короткострокове застосування. Прогнозоване використання спрею. Якщо симптоми не зникнуть протягом тижня, це може бути ознакою органічного захворювання, такого як абсцес або пухлина, яке потребує додаткового лікування. Якщо у пацієнта виникли серйозні симптоми болю в горлі, такі як

лихоманка, головний біль, висип, нудота або блювання, він повинен звернутися до лікаря протягом одного-двох днів. Вам слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо ваш стан продовжує погіршуватися. Побічні ефекти, які найчастіше виникали, включали висип, спричинений пастилками, або подразнення в місці нанесення під час полоскання.

Висновки. Опитування фокус-груп, яке включало батьків педіатричних пацієнтів і фармацевтів, які відпускають препарати фенолу, показало, що ці ліки найбільш ефективні та безпечні для дітей із болем у горлі. У результаті моніторингу розвитку взаємодії було виявлено, що орасептики, а саме препарати фенолу, були надзвичайно безпечними для дітей у 95% випадків призначення. Результати, отримані нами, свідчать про те, що дані ЛЗ є надзвичайно безпечними. Це означає, що при використанні препаратів фенолу необхідно проводити фармацевтичну опіку. Це необхідно, щоб зменшити ризики взаємодій і поліфармації.