

Киевский институт усовершенствования врачей
Луганский медицинский институт
Республиканское научно-медицинское общество
иммунологов и аллергологов
Отдел экологии и природопользования
Луганской областной государственной администрации

МАТЕРИАЛЫ

НАУЧНОЙ СЕССИИ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ»**

Киев — Луганск, 1992

СЛОЖНОСТИ В ВЫЯВЛЕНИИ ДИФТЕРИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

А. К. Дуда, А. М. Печенка, И. В. Шестакова

Киев

Практическое здравоохранение столкнулось с тем, что больные дифтерией поступают на лечение в поздние сроки болезни, что неблагоприятно сказывается как на течении заболевания, так и возможности развития самых различных осложнений, вплоть до смерти больного. Позднее поступление отрицательно сказывается и на эффективность специфической серотерапии, так, циркулировавший ранее экзотоксин уже, как правило, проник внутрь клеток-мишеней. Всегда ли оправдано применение противодифтерийной сыворотки в поздние сроки болезни, особенно в дозах, превышающих обычные?

В данной работе проанализированы сроки поступления больных с дифтерией в инфекционное отделение 14-й городской клинической больницы г. Киева. Даже одноразовый выбор из 18 больных, находившихся одновременно на лечении, показал, что к концу первых -- началу вторых суток болезни, в отделение поступило всего 4 больных. У них отмечалось манифестирующее начало с выраженной интоксикацией. На 3-и сутки болезни не поступил никто. На 4-е сутки болезни поступило 7 человек. Это больные, которые с самыми различными заболеваниями ротоглотки находились на амбулаторном лечении, но, в связи с эпид. настороженностью, у них были взяты посевы со слизистой зева и носа, и к 4-м суткам болезни выявлены коринебактерии дифтерии, после чего они были госпитализированы в инфекционное отделение. По трое больных госпитализировано на 5-е, и 7-е сутки болезни. Один больной был выявлен как бактерионоситель, когда при подготовке к плановой операции на ЛОР-органах был взят мазок на ВЛ и получен положительный результат.

Таким образом, можно сделать заключение, что узким звеном остается первичный, поликлинический этап выявления больных. Необходимо совершенствовать клиническую диагнос-