



## ЗМІСТ

### ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

- Упроченна реставрація після эндодонтического лікування 7  
*І.О. Белоіваненко*

- Восстановлення естетики передніх зубів  
с посредством композитної реставраційної системи  
«Jen-Radiance» 11  
*Ю.Г. Коленко, Т.В. Літвін*

### ЭНДОДОНТИЯ

- Електронно-мікроскопічне дослідження  
стану кореневих каналів після інструментальної обробки  
озонованою олією 16  
*А.В. Борисенко, І.С. Семенова*

### ПАРОДОНТОЛОГІЯ

- Безпосередні результати лікування хворих  
на генералізований пародонтит  
з використанням фітогелю «Нанозалото» 20  
*А.В. Борисенко, О.Б. Ткач*

- Ультраструктурні порушення судин пародонту  
у хворих на цукровий діабет 24  
*С.С. Різник, Ю.Б. Різник*

### ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

- Схема профілактики каріесу тимчасових зубів  
у дітей до 24 місяців 28  
*В.А. Кузьміна, І.І. Якубова*

- До питання про формування психологічного підходу  
до дитини під час стоматологічного прийому 32  
*Н.В. Біденко, О.І. Остапко, О.І. Ковал*

### ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

- Участь сірки (макроелемента)  
та кобальту (мікроелемента) у процесах мінералізації  
кісткової тканини верхньої щелепи  
в динаміці пренатального онтогенезу людини 36  
*А.П. Ошурко, І.Ю. Олійник*

- Дослідження біометричних показників стану  
щічного коридору в пацієнтів з різними типами обличчя  
при хірургічному заборі щічного жирового тіла 40  
*Ю.В. Вовк, О.В. Ружицька, В.Ю. Вовк*

## CONTENTS

### PREVENTIVE DENTISTRY

- Enhanced restoration after endodontic treatment 7  
*I.Beloivanenko*

- Restoration of the aesthetic of the frontal teeth  
by means of the composite restoration system  
«Jen-Radiance» 11  
*Yu. Kolenko, T. Litzvin*

### ENDODONTICS

- Electronomicroscopic investigation  
of the root canals state after instrumentation  
with ozone oil 16  
*A. Borysenko, I. Semenova*

### PERIODONTOLOGY

- Nearest results of treatment of patients  
with generalized parodontitis with using  
Nanozoloto phytogels 20  
*A. Borysenko, O. Tkach*
- Ultrastructural disorders of periodontal vessels  
in patients with diabetes mellitus 24  
*S. Riznyk, Yu. Riznyk*

### CHILDREN'S AND PREVENTIVE DENTISTRY

- Character of prevention of karisis of temporal lubs  
in children under 24 months 28  
*V. Kuz'mina, I. Yakubova*
- Forming of psychological approach for child  
during dental treatment 32  
*N. Bidenko, O. Ostapko, O. Koval*

### MAXILLOFACIAL SURGERY AND SURGICAL DENTISTRY

- The participation of sulfur (macroelement)  
and cobalt (microelement) in the mineralization processes  
of the bone tissue of the upper jaw in the dynamics  
of human prenatal ontogenesis 36  
*A. Oshurko, I. Olymyk*
- The study of biometric parameters of the state  
of buccal corridor in patients with different types of face  
with surgical extraction of buccal fat pad 40  
*Yu. Vovk, O. Ruzhytska, V. Vovk*

A.V. Борисенко, I.C. Семенова

## Електронно-мікроскопічне дослідження стану кореневих каналів після інструментальної обробки озонованою олією

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

**Резюме.** Ендодонтичне лікування ускладнень каріесу (пульпіту, періодонтиту) займає значне місце серед інших проблем стоматології. Показана ефективність застосування озону в комплексному ендодонтичному лікуванні пульпіту й періодонтиту. Ураховуючи це, важливим є подальше обґрунтування застосування різних медикаментозних форм озону для лікування періодонтиту.

**Мета дослідження:** електронно-мікроскопічне дослідження стану кореневих каналів зубів після їх обробки озонованою олією.

**Матеріал і методи дослідження.** Матеріалом дослідження були видані за ортодонтичними показаннями в пацієнтів 20–30-ти років 20 постійних зубів (премолярів), які були розділені порівну на дві групи: основну й порівняння. Зуби трепанували, розкривали порожнину зуба, видаляли залишки пульпи, проводили інструментальну обробку кореневих каналів. Кореневі канали зубів першої основної групи обробляли 2,5 % розчином гіпохлориту натрію та озонованою олією, кореневі канали зубів другої групи порівняння обробляли підігрітим розчином 2,5 % гіпохлориту натрію та ЕДТА. Електронно-мікроскопічні дослідження проводили за методикою Ф.М. Мамедової та співавтор. [13–14], методом растрової електронної мікроскопії.

**Результати дослідження та їх обговорення.** Після інструментальної обробки кореневих каналів на стінках каналу практично відсутні органічні залишки. Забруднений шар зберігався лише на окремих ділянках, здебільшого в апікальній частині кореня. У стінках дентинних трубочок відкриті. Після інструментальної обробки кореневих каналів 2,5 % розчином гіпохлориту натрію та озонованою олією також досягається надійне видалення забрудненого шару зі стінок кореневих каналів. В устях дентинних трубочок виявлено озоновану олію. Вона проникає в устя дентинних трубочок і в самі трубочки.

**Висновки.** Застосування медикаментозної комбінації 2,5 % розчином гіпохлориту натрію та озонованою олією також дозволяє досягти високої якості очищення кореневого каналу, видалення забрудненого шару й розкриття устя дентинних трубочок. Озонована олія проникає в устя дентинних трубочок.

**Ключові слова:** озонована олія, електронно-мікроскопічне дослідження, кореневі канали.

### Актуальність

На сьогодні ендодонтичне лікування ускладнень після каріесу (пульпіту, періодонтиту) займає значне місце серед інших проблем стоматології. Це викликано значною розповсюдженістю каріесу та його ускладнень і значною потребою населення України в їх лікуванні [1, 2, 4, 9, 20]. В Україні є в достатньому доступі сучасні ендодонтичні інструменти, медикаментозні засоби, пристрой та методики ендодонтичного лікування. Проте ці засоби та саме лікування є досить високовартісними й не можуть забезпечити потреби населення в ендодонтичному лікуванні [10–12, 17, 19]. Показана ефективність застосування озону в комплексному ендодонтичному лікуванні пульпіту і періодонтиту [5–8, 18]. Ураховуючи це, важливим є подальше обґрунтування застосування різних медикаментозних форм озону для лікування періодонтиту.

**Мета** дослідження – електронно-мікроскопічне дослідження стану кореневих каналів зубів після їх обробки озонованою олією.

### Матеріал і методи дослідження


Матеріалом дослідження були видані за ортодонтичними показаннями в пацієнтів 20–30-ти років 20 постійних зубів (премолярів), які були розділені порівну на дві групи: основну й порівняння. Видані зуби ретельно промивали у проточній воді від крові та слизу, вичищали від залишків м'яких тканин за допомогою ексекатора та торцевої щіточки на низьких обертах. Кожний зразок зуба попередньо готовували таким чином.

Зуби трепанували, розкривали порожнину зуба, видаляли залишки пульпи, проводили інструментальну обробку кореневих каналів. Кореневі канали зубів першої основної групи обробляли 2,5 % розчином гіпохлориту натрію та озонованою олією, кореневі канали зубів другої групи порівняння обробляли підігрітим розчином 2,5 %


гіпохлориту натрію та ЕДТА. Для приготування озонованої олії 25 мл олії «Евгенол» (Владміра) барботували (озонували) протягом однієї години при концентрації озону 35 мг/л та швидкості потоку 0,5 л/хв. за допомогою апарату «ОЗОН УМ-80». Після обробки кореневі канали висушували паперовими штифтами. Для електронно-мікроскопічного дослідження готовували поздовжні (через кореневий канал) шліфи зі зрубом.

Електронно-мікроскопічні дослідження проводили за методикою Ф.М. Мамедової та співавтор. [13–15], методом растрової електронної мікроскопії в лабораторії відділення фотоелектроніки Інституту фізики ім. І.М. Францевича НАН України (зав. лабораторією канд. тех. наук Самірюк А.В.).


Після приготування зразків зі зрубом їх шліфували дрібно-зернистими еластичними дисками «Soft-Lex» («3M»). Шліфування та полірування поверхонь шліфів зубів проводили до отримання дзеркальної поверхні. Безпосередньо перед електронно-мікроскопічним дослідженням шліфи протирали петролейним ефіром. Для очищення від забруднень поверхню шліфа протравлювали 36 % ортофосфорною кислотою протягом 20-ти секунд і протирали петролейним ефіром. Шліфи за допомогою вуглецевого струмопровідного клею закріплювали на латунних п'єдесталах. Їх розміщували у вакуумній камері, де проводили напилювання поверхні шліфа золотом (99,99 % AU) до утворення на них плівки з чистого золота товщиною 150 Å. Такої товщини провідної плівки достатньо для подальшого електронно-мікроскопічного дослідження зразків в рентгенівському мікроаналізаторі «Superprobe-733» (JEOL, Японія). Після напилення п'єдестали зі зразками шліфів досліджували на рентгенівському мікроаналізаторі «Superprobe-733» (JEOL, Японія). Розрішення по зображеню у вторинних електронах (SEI, Secondary Electron Image) до 7 нМ, робочий вакуум:  $1\times 10^{-5}$  А. Дослідження проведено при прискоренні напруги 25 кВ і струмі пучка  $1\times 10^{-10}$  А.



**Рис. 1.** Після інструментальної обробки з використанням 2,5% розчину гіпохлориту натрію та ЕДТА. На поверхні стінки кореневого каналу видно відкриті устя дентинних трубочок. Електронна мікроскопія. Зб. 3000.



**Рис. 2.** Після інструментальної обробки з використанням 2,5% розчину гіпохлориту натрію та озонованої олії. На поверхні стінки кореневого каналу видно відкриті устя дентинних трубочок, закриті плявкою озоніду. Електронна мікроскопія. Зб. 1000.



**Рис. 3.** Після інструментальної обробки з використанням 2,5% розчину гіпохлориту натрію та озонованої олії. На поверхні стінки кореневого каналу видно устя дентинної трубочки, закриті плявкою озоніду. Електронна мікроскопія. Зб. 3000.

Отримані результати фотографували за допомогою вбудованого в мікроскоп цифрового фотоапарата, пов'язаного з комп'ютером (мікрофото далі з комп'ютера переносили на CD). Отримані результати фіксували на електронних цифрових носіях зі збільшенням в 1000 разів. На отриманих мікрофотографіях візуально проводили порівняння досліджуваних об'єктів.

В усіх лабораторних методиках проводили дослідження не менше п'яти зразків. Отримані результати обробляли статистично [3, 16].

### Результати дослідження та їх обговорення

Відразу після інструментальної обробки кореневих каналів на стінках кореневих каналів, а також в їх просвітах виявляються численні агломерати або їх фрагменти різних розмірів. На стінках та в устях дентинних канальців відмічаються органічні залишки (пульпи та дебрісу). Таким чином, це свідчить про наявність на стінках кореневого каналу забрудненого (змазаного, smear) шару. Звертає на себе увагу різна товщина забрудненого шару в середній і верхівковій частинах кореневих каналів: найменша в устовій частині і збільшується у напрямку верхівки. В окремих зонах, зокрема в ділянках зігнутості кореневих каналів, зустрічаються поверхневі заглиблення, борозенки.

Забруднений шар утворюється на стінках кореневих каналів при препаруванні ручними інструментами. Він складається переважно з ошурків дентину, залишків органічних і неорганічних речовин. Його товщина різна в різних частинах кореневого каналу й у середньому складає 1,5–2,0 мм. Наявність забрудненого шару перекриває доступ у дентинні трубочки. На сьогодні для успішного ендодонтичного лікування вважається необхідним видалення забрудненого шару зі стінок кореневого каналу.

Препарування кореневих каналів ручними ендодонтичними інструментами в разі дотримання техніки обробки з використанням 2,5 % розчину гіпохлориту натрію й ендолубриканта ЕДТА призводить до якісного

очищення каналів. Таке препарування кореневих каналів супроводжується деякими змінами структури їх стінок – появою шорсткості, борозенок,

Після інструментальної обробки кореневих каналів на стінках каналу практично відсутні органічні залишки. Забруднений шар зберігається лише на окремих ділянках, здебільшого в апікальній частині кореня. Устя дентинних трубочок відкриті (рис. 1).

В апікальній частині кореневих каналів у більшості зразків досягнуто задовільний рівень очищення. На стінці кореневого каналу виявлені лише незначна кількість дентинних ошурок, забруднений шар незначної товщини. Устя дентинних трубочок переважно закриті залишками забрудненого шару.

Після інструментальної обробки кореневих каналів 2,5 % розчином гіпохлориту натрію та озонованою олією також досягається надійне видалення забрудненого шару зі стінок кореневих каналів (рис. 2). Устя дентинних трубочок відкриті. В устях дентинних трубочок виявлена озонована олія. Вона проникає в устя дентинних трубочок і в самі трубочки (рис. 3). Це забезпечує надійне проникнення даного медикаментозного засобу як у розгалуження кореневого каналу, так і в дентинні трубочки. Подібний результат є гарантією ефективної антибактеріальної дії даної комбінації медикаментозних засобів.

### Висновки

Проведене експериментальне електронно-мікроскопічне дослідження показало високу якість інструментальної обробки кореневих каналів з використанням комбінації антисептика й лубриканта. Застосування медикаментозної комбінації 2,5 % розчину гіпохлориту натрію та озонованої олії також дозволяє досягти високої якості очищення кореневого каналу, видалення забрудненого шару й розкриття устів дентинних трубочок. Озонована олія проникає в устя дентинних трубочок і, таким чином, перешкоджає проникненню мікрофлори і дентинні трубочки. У цілому це є гарантією ефективного ендодонтичного лікування зубів з періодонтитом.

### ЛІТЕРАТУРА

- Боровский Е.В. Распространенность осложнений кариеса и эффективность эндодонтического лечения / Е.В. Боровский, М.Ю. Протасов // Клиническая стоматология. – 1998. – № 3. – С. 4–7.
- Боровский Е.В. Состояние эндодонтии в цифрах и фактах / Е.В. Боровский // Клиническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 38–40.
- Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – Москва: Практика, 1999. – 459 с.
- Деньга О.В. Адаптогенна профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О.В. Деньга. – К., 2001. – 32 с.
- Коваль А.В. Эндодонтическая обработка корневых каналов зуба с использованием озоно-кислородной смеси // Вісник стоматології. – 2009. – № 3. – С. 19–22.
- Коваль А.В. Применение озоно-кислородной смеси для дезинфекции жировых каналов при хроническом грануллематозном периодонтите / А.В. Коваль // Вісник стоматології. – 2009. – № 4. – С. 84–87.
- Коваль О.В. Клініко-лабораторне обґрунтування методу обробки кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О.В. Коваль. – Одеса, 2010. – 20 с.

8. Коваль О.В. Клінічна ефективність різних методів дезінфекції кореневих каналів в ендодонтичній практиці / О.В. Коваль, О.В. Деньга // Вісник стоматології. – 2010. – № 4.– С. 33–36.
9. Косенко К.М. Епідеміологія основних стоматологічних захворювань у населенні України і шляхи їх профілактики: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / К.М. Косенко. – К., 1994. – 45 с.
10. Кузіна В.В. Двоетапне лікування хронічного періодонтиту постійних зубів з використанням композиції «Сілгап» (експериментально-клінічне дослідження): Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / В.В. Кузіна. – Харків, 2005. – 19 с.
11. Кунін А.А. Современные аспекты эндодонтического лечения зубов / А.А. Кунин, М.О. Зойбельман, Т.А. Попова и др. // Клиническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 22–27.
12. Лукоянова Н.С. Особливості клініки та лікування періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14.01.22 / Н.С. Лукоянова, Українська медична стоматологічна академія. – Полтава, 2005. – 16 с.
13. Мамедова Ф.М. Изготовление шлифов из недекальцинированных тканей зуба / Ф.М. Мамедова, В.А. Крахмалев, Д.С. Абдрасулова // Мед. журнал Узбекистана. – 1981. – № 2. – С. 77–78.
14. Мамедова Ф.М. Оптико-микроскопическое определение объемной структуры dentina корней зуба человека / Ф.М. Мамедова, В.А. Крахмалев, Д.С. Абдрасулова // Стоматология. – 1980. – № 4. – С. 12–14.
15. Мамедова Ф.М., Крахмалев В.А. Микроскопическая анатомия корня зуба / Ф.М. Мамедова, В.А. Крахмалев. – Москва, 1988. – 131 с.
16. Минцер О.П. Методы обработки медицинской информации. Учебное пособие / О.П. Минцер, Б.Н. Угаров, В.В. Власов. – Киев: Вища школа, 1991. – 272 с.
17. Полозок Д.М. Обґрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення ефективності лікування хронічних періодонтітів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / Полозок Д.М., Національний медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – К., 2007. – 18 с.
18. Снегирев М.В. Клинико-лабораторное обоснование применения медицинского озона при лечении пульпита и периодонтита: Автореф. дис. ... канд. мед. н. – М., 2010. – 28 с.
19. Цевух Л.Б. Комплексне лікування періодонтиту постійних зубів з несформованними коренями у дітей: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 / Цевух Л.Б., Державна установа «Інститут стоматології АМН України». – О., 2009. – 18 с.
20. Яловий Л.М. Оптимізація ефективності та контролю обробки і пломбування кореневих каналів: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Л.М. Яловий. – Київ, 2002. – 22 с.

### Електронно-микроскопическое исследование состояния корневых каналов после инструментальной обработки озонированным маслом

A.B. Борисенко, I.C. Семенова

**Резюме.** Эндодонтическое лечение осложнений карIESа (пульпита, периодонтита) занимает значительное место среди других проблем стоматологии. Показана эффективность применения озона в комплексном эндодонтическом лечении пульпита и периодонтита. Учитывая это, важным является дальнейшее обоснование применения различных медикаментозных форм озона для лечения периодонтита.

**Цель исследования:** электронно-микроскопическое исследование состояния корневых каналов зубов после их обработки озонированной маслом.

**Материал и методы исследования.** Материалом исследования были удаленные по ортодонтическим показаниям у пациентов 20–30-ти лет 20 постоянных зубов (премоляров), которые были разделены поровну на две группы – основную и группу сравнения. Зубы трепанировали, раскрывали полость зуба, удаляли остатки пульпы, проводили инструментальную обработку корневых каналов. Корневые каналы зубов первой основной группы обрабатывали 2,5 % раствором гипохлорита натрия и озонированым маслом, корневые каналы зубов второй группы сравнения – подогретым 2,5% раствором гипохлорита натрия и ЭДТА. Электронно-микроскопические исследования проводили по методике Ф.М. Мамедовой и соавтор. [13–14] методом растровой электронной микроскопии.

**Результаты исследования и их обсуждение.** После инструментальной обработки корневых каналов 2,5 % раствором гипохлорита натрия и ЭДТА на стенах канала практически отсутствуют органические остатки. Смазанный слой сохранялся лишь на отдельных участках, преимущественно в апикальной части корня. Устья дентинных трубочек открыты. После инструментальной обработки корневых каналов 2,5 % раствором гипохлорита натрия и озонированным маслом также достигается надежное удаление смазанного слоя со стенок корневых каналов. В устьях дентинных трубочек обнаружено озонированное масло. Оно проникает в устья дентинных трубочек и в сами трубочки.

**Выводы.** Применение медикаментозной комбинации 2,5 % раствора гипохлорита натрия и озонированной масла также позволяет достичь высокого качества очистки корневого канала, удаления смазанного слоя и раскрытия устьев дентинных трубочек. Озонированное масло проникает в устья дентинных трубочек.

**Ключевые слова:** озонированное масло, электронно-микроскопическое исследование, корневые каналы.

### Electronmicroscopic investigation of the root canals state after instrumentation with ozone oil

A. Borysenko, I. Semenova

**Summary.** Endodontic treatment of caries complications (pulpitis, apical periodontitis) occupies a significant place among other problems in dentistry. The effectiveness of using ozone in the complex endodontic treatment of pulpitis and apical periodontitis is shown. Considering this, it is important to further substantiation of the use of various ozone medical forms for the treatment of apical periodontitis.

**Objective.** Electron microscopic examination of teeth root canals after instrumentation with ozonized oil.

**Method.** Materials of the study were 20 permanent teeth (premolars), removed for orthodontic indications in 20–30 years patients of which were divided equally into two groups: the main and comparison. Teeth trepaning, opening the tooth cavity, removing the remnants of the pulp, and instrumentation of root canals. The root canal teeth of the first main group were treated with 2.5 % sodium hypochlorite solution and ozonized oil, root canal teeth of the second group of comparison were treated with a heated solution of 2.5 % sodium hypochlorite and EDTA. Electron microscopic investigations were carried out according to the method of F.M. Mamedova [13–14] by the method of raster electron microscopy.

**Results of the research and their discussion.** After the instrumentation of the root canals with 2.5 % sodium hypochlorite and EDTA on the walls of the channel, virtually no organic residues. The smear layer was stored only on separate sites, mostly in the apical part of the root. Dentinal tubules are open. After instrumentation of root canal with 2.5 % sodium hypochlorite solution and ozonized oil, it is also possible to safely remove the smear layer from the walls of the root canals. Ozonized oil was found in the openings of the dentinal tubules. It penetrates into the openings of dentin tubules and tubes itself.

**Conclusions.** The use of the drug combination of 2.5% solution of sodium hypochlorite and ozonized oil also allows to achieve high quality root canal cleansing, removal of the smear layer and opening of the dentinal tubules. Ozonized oil penetrates the openings of the dentin tubules.

**Key words:** ozonized oil, electron microscopic examination, root canals.

**Борисенко А.В.** – професор, д-р мед. наук, зав. кафедрою терапевтичної стоматології.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

**Семенова І.С.** – аспірант кафедри терапевтичної стоматології.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна. E-mail: anatoliy.borysenko@nmu.ua. Тел.: (050) 447-38-00.